

Wobenzym®

Mějte mě doma

Při chřipce a nachlazení

Pro podporu imunity

Po úrazech a operacích

U zánětů kloubů, šlach a svalů

U gynekologických

a urologických zánětů



... už 40 let

účinně pomáhá



Wobenzym®

inzerce

Wobenzym - tradiční lék k podpůrné léčbě z přírodních zdrojů.
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.



MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhřetěveská 448, 252 43 Průhonice,
konzultace na: +420 267 750 003, www.mucos.cz, www.wobenzym.cz

Wobenzym®

Přírodní enzymy proti zánětům, otokům a poruchám imunity

Při zvládání zánětů mají v našem těle zvláštní význam takzvané proteolytické enzymy. Pomáhají nám zajišťovat rovnováhu imunitního systému tak, aby záněty proběhly rychle a bez následků. Jestliže však máme oslabenou imunitu nebo nás ohrožuje silný zánět, je vhodné podpořit náš obranný systém podáváním takových enzymů zvenčí. Zabývá se tím speciální oblast medicíny - systémová enzymoterapie. Nejznámějším a nejpoužívanějším lékem je zde Wobenzym.

Proč Wobenzym pomáhá u tolika onemocnění?

Enzymy, které Wobenzym obsahuje, působí proti zánětům kdekoli v našem těle. Urychlují vstřebávání otoků, krevních podlitin a výronů, zkracují dobu hojení a podporují úplné doléčení zánětů tak, aby nedocházelo k jejich opakování nebo nepřecházely do chronického stavu. Wobenzym tedy může pomoci i tam, kde pacient trpí více záněty současně. Protože záněty jsou součástí mnoha zdravotních obtíží, Wobenzym lze používat při léčbě širokého okruhu onemocnění. O tom, že je přitom opravdu účinný, svědčí i skutečnost, že letos slaví už čtyřicáté výročí. Za tu dobu pomohl miliónům pacientů v různých zemích světa a každým dnem pomáhá dalším.

ONEMOCNĚNÍ	DÁVKOVÁNÍ	DOBA LÉČBY	ÚČINEK
Záněty horních a dolních dýchacích cest, uší, hlasivek	Dospělí: 3x5 dražé Děti: 1 dražé / 6 kg hmotnosti / den	Užívat do odeznění klinických příznaků. S ústupem obtíží lze postupně snižovat na dávku 3x3 dražé denně.	Podpora procesu hojení zánětu a posílení snížené obranyschopnosti organismu. Zmírnění otoku sliznic. Zvýšení účinnosti antibiotik.
Záněty močových cest			
Záněty pohlavních orgánů			
Záněty v oblasti trávicího traktu, záněty kůže, jiné záněty			
Záněty povrchových žil	Dospělí: 3x7 až 3x5 dražé	Užívat alespoň po dobu 2-3 týdnů.	Podpurná léčba zahrnující: - urychlení hojení zánětů a vstřebávání otoků - omezení vzniku otoků po zátěži - zmírnění bolestí, pocitu těžkých nohou - zlepšení tekutosti krve a mikrocirkulace
Potrombotický syndrom (stav po ucpaní žily krevní sraženinou)	Dospělí: 3x10 až 3x5 dražé	Užívat minimálně po dobu 5-6 týdnů.	
Artróza	Dospělí: 3x6 dražé	Užívat nejméně po dobu 5-6 týdnů.	Podpurná léčba zahrnující: - omezení projevů zánětu - zmírnění bolestí při pohybu i v klidu - ústup otoků - zlepšení hybnosti - zkrácení ranní ztuhlosti
Revmatismus měkkých tkání (tenisový loket, zánět Achillovy šlachy, „zamrzlé rameno“)	Dospělí: 3x5 dražé Děti: 1 dražé / 6 kg hmotnosti / den	Užívat nejméně po dobu 3-4 týdnů.	
Revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů s podílem autoimunitní reakce)	Dospělí: 3x5 dražé Děti: 1 dražé / 6 kg hmotnosti / den	Užívat po dobu alespoň 5-6 měsíců, obvykle jako součást komplexní léčby.	

ONEMOCNĚNÍ	DÁVKOVÁNÍ	DOBA LÉČBY	ÚČINEK
Mnohočetná mozkomíšní skleróza	Dospělí: 1.-14. den 3x10 dražé, pak se přechází na udržovací dávku 3x3 dražé. Léčba musí být konzultována s lékařem.	Užívat dlouhodobě, u zátěžových stavů se dávkování zvyšuje na 3x10 dražé	Podpurná modulace zánětlivého procesu a imunitního systému.
Pouřazové otoky	Dospělí: 3x5 až 3x10 dražé podle závažnosti úrazu. Děti: 1 dražé / 6 kg hmotnosti / den.	Léčbu zahájit vyšší dávkou, po 7-10 dnech postupně snižovat, užívat až do úplného vymizení příznaků.	Urychlení vstřebávání otoků a krevních podlitin a výronů. Zmírnění bolestí. Zkrácení doby léčby. Nejlepší efekt při zahájení léčby co nejdříve po úrazu.
Některé pooperační stavy v chirurgii	Dospělí: zahájení léčby 3x5 až 3x10 dražé. Děti: 1 dražé / 6 kg hmotnosti / den.	Úvodní dávku užívat v prvních dnech po operaci (až do 10 dnů), po odeznění akutního stavu postupně snižovat na 3x5 až 3x3 dražé. Užívat až do úplného odeznění příznaků.	Podpurná léčba: - urychluje vstřebávání otoků, krevních podlitin a výronů - zkracuje dobu hojení po operaci
Fibrocystická mastopatie (chronické onemocnění prsu s tvorbou cyst a vaziva)	Dospělí: 2x10 dražé. Léčbu zahájit až po vyšetření lékařem!	Nejméně po dobu 6 týdnů.	Zmírnění bolestivosti.
Lymfedémy (otoky způsobené hromaděním mízy)	Dospělí: zahájení léčby 2x10 nebo 3x7 dražé, později 3x5 až 3x3 dražé. V této indikaci je vždy třeba poradit se s lékařem!	Úvodní dávku užívat minimálně 4-5 týdnů, dále dle výsledků léčby a doporučení lékaře. Léčba by měla být dlouhodobá.	Zlepšení průchodnosti lymfatických cév, vstřebávání lymfatického otoku.

Jak Wobenzym správně užívat a jaké balení koupit?

Wobenzym je nutné užívat nalačno v dostatečném odstupu od jídla – to znamená alespoň ½ hodiny před jídlem a nejméně 2 hodiny po posledním předcházejícím jídle. Nerozkousané tablety je třeba vydatně zapít 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávné užívání snižuje účinek léku.

Kupujte vhodnou velikost balení podle předpokládané doby užívání: balení po **40 dražé** pro krátkodobé užívání pro děti a do příruční lékárny na cesty, po **200 dražé** pro léčbu trvající 2-3 týdny, balení po **800 dražé** pro déletrvající užívání a jako rodinné balení.

Z textu této brožury nesmí vzniknout dojem, že vždy postačí užívat pouze Wobenzym. Ten je často používán jako součást komplexní léčby, společně s jinými léky a postupy, či jako podpurná léčba. Léčbu dětí je nutné konzultovat s lékařem.

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhřetěveská 448, 252 43 Průhonice
konzultace na: +420 267 750 003, www.mucos.cz, www.wobenzym.cz

*Lék k vnitřnímu užití
z přírodních zdrojů.*